

По проводимым разным исследованиям, в возрасте от 3 месяцев до 10 лет, в 30% случаев у собак найдено заболевание позвоночника, при этом максимальный риск развития найден у 3-5 летнего возрастов.

Заболевание позвоночника у испытуемых собак, носит генетический характер. У некоторых из них обнаружена гипотрофия спинных мышц (недостаточная физическая активность).

Также был найден остеопороз (недостаток витамина Д или нет кальция в рационе пищи собаки) и малое количество получаемого ультрафиолета естественным путем. Распространение таких видов заболевания у такс связано с анатомическими особенностями этих пород. Имея удлиненное тело и короткие конечности, и слабые плечи, резкие движения таксы, могут привести до травм межпозвоночных тканей диска.

Когда собака становится вялой (малоподвижной), перестает прыгать на диван, горбит спину – это все признаки появившейся начальной стадии болезни, например такие тяжелые [болезни собак - опухоли](#) . Начальные стадии болезней таксы, зачастую протекают не замечено. Что в итоге чревато для вашего питомца.

Чтобы не возникало случаев и заболеваний вашей собаки, в первую очередь обратите ваше внимание на правильный ее тренинг. Одним из основных упражнений для собаки будет плавание, оно позволит укрепить мышцы спины. Также большую роль играют препараты минералорегулирующего и хондропротективного действий. Но самое использование препаратов для собаки лучше всего начинать, когда ему уже 2-3 года. Не допускайте появления симптомов. Любите ваших питомцев, и они ответят вам взаимностью!